

Don à la Bibliothèque. — La Société adresse ses remerciements à M. SEILLIÈRE père, qui a fait don à notre Bibliothèque d'une série d'ouvrages ayant appartenu à son fils, notre regretté collègue Gaston SEILLIÈRE, et dont la liste figurera au Bulletin bibliographique.

Observations diverses.

Rectification [COL.]. — M. A. MÉQUIGNON indique la rectification suivante :

Dans la liste de Coléoptères du Vendômois (2^e note), parue cette année au *Bulletin* n° 8, p. 197, au lieu de *Sphaeriestes aeneus* Steph., lire : *S. Regi* Ab. — Le *S. aeneus* est un insecte des régions montagneuses qui se trouve sur les Sapins tombés.

Communications.

Description d'un Lucanide nouveau [COL.]

par H. BOILEAU.

Prosopocoelus Pascoei, n. sp. — Très voisin du *P. Oweni* Hope, mais distinct et facile à séparer par l'armature des mandibules, la forme du prothorax et par la couleur d'un roux foncé uniforme.

♂ (Forme moyenne, 2 spécimens). Tête à peu près rectangulaire, mais avec des saillies anguleuses aux joues et une forte échancrure antérieure. Le bord frontal est échancré en arc de cercle; l'épistome, peu saillant, forme une pointe ogivale émoussée, simple, bordée par un bourrelet derrière lequel la surface est concave. Le front est séparé de la surface supérieure de la tête par une arête émoussée; il est concave, faiblement granuleux, assez brillant.

Le disque céphalique, limité en avant par le bord frontal, est plan et a la forme d'un croissant élargi s'étendant moins en arrière que chez *P. Oweni*; il est dépoli et granuleux. Sur son contour postérieur la surface s'arrondit en devenant plus lisse et plus brillante. Les joues sont granuleuses et ternes; elles portent une forte saillie anguleuse aiguë, dirigée latéralement, au moins aussi forte que chez *P. Oweni* et très légèrement moins large à la base.

Les angles céphaliques antérieurs sont arrondis, raccordés par une petite sinuosité concave avec les canthus oculaires dont la partie antérieure est largement développée et arrondie. Les côtés des canthus sont légèrement convexes (un peu sinueux chez *P. Oweni*); ils entaillent l'œil à moitié. Les antennes ont le fouet plus court que le scape; le peigne est constitué par les trois articles terminaux. Le dernier article est seul entièrement feutré sur sa surface apparente; le précédent (9^e) a un petit segment brillant sur sa région terminale dorsale; le 8^e a sa région dorsale brillante sur toute sa longueur. Les lamelles du peigne sont assez courtes. Le 7^e article porte un éperon bien développé, incliné vers la base de l'antenne et terminé par plusieurs soies. Le 6^e article est lui-même légèrement renflé. Les divers articles du fouet vont en diminuant de longueur du 7^e au 3^e, le 2^e est de très peu plus long que celui-ci.

Les mandibules sont moins courbées et plus allongées que chez *P. Oweni*; elles portent sur la carène interne inférieure une seule dent bien développée au lieu des deux dents du *P. Oweni*. La dent basale de celui-ci manque et la dent qui reste est plus près de la base que la deuxième dent de cette espèce; elle est aussi plus inclinée vers l'avant.

La partie supérieure de la mandibule diffère également dans les deux espèces. Chez les exemplaires moyens du *P. Oweni*, on voit un denticule à peu près à mi-distance de la base de la mandibule et du commencement de la carène dentelée. Chez le *P. Pascoei*, il existe seulement une légère ondulation convexe à la place de ce denticule. La carène dentelée est plus longue chez le *Pascoei*; les denticules sont un peu plus développés et moins serrés. Il y en a cinq sur la mandibule gauche, en plus de l'extrémité aiguë, et sept sur la mandibule droite, le premier denticule vers la base étant dédoublé et un denticule supplémentaire existant entre ceux placés en regard du 4^e et du 5^e. La surface des mandibules est dépolie.




Fig. 1. — *Prosopocoelus Pascoei*
Boifeau, 1a. — Antenne.

Fig. 2. — *Prosopocoelus Oweni*
Hope.

En dessous, le menton est légèrement trapézoïdal, avec les angles antérieurs arrondis; sa surface est granuleuse et porte des points cicatriciels espacés, régulièrement disposés. Le sous-menton est granuleux et assez brillant; les joues sont granuleuses et ternes.

Le plus petit spécimen a des mandibules plus brèves, ne portant que quatre denticules sur la carène supérieure gauche, mais les deux premiers, le premier surtout, sont légèrement échancrés au sommet et ont tendance à se dédoubler. Il y a cinq denticules à droite, mais le deuxième à partir de la base est presque dédoublé. La dent de la carène inférieure est plus renflée à la base que chez le grand exemplaire. La saillie des joues est très aiguë, la tête est petite.

Chez les deux spécimens, le prothorax est court; son angle antérieur médian est émoussé, mais moins arrondi que chez *P. Oweni*. Les angles latéraux antérieurs, étroitement appliqués contre la tête, sont arrondis; leur bord externe se dirige d'abord obliquement en dehors, puis forme une courbe convexe et se raccorde par un arc concave avec le côté du prothorax, légèrement convexe et presque parallèle à l'axe longitudinal. Ce contour est beaucoup moins complexe chez *P. Oweni*. L'angle latéral est nettement marqué, en ogive très obtuse, et se raccorde par un arc légèrement concave à l'arc convexe qui remplace l'angle postérieur complètement effacé. Le bord postérieur est légèrement bisinué.

La surface du pronotum est subcylindrique; la région médiane du disque, très finement granuleuse, est brillante, avec une ponctuation peu serrée, régulière et faiblement marquée; les côtés, plus fortement granuleux, sont ternes.

L'écusson a la forme d'un pentagone à angles arrondis; sa surface est brillante avec quelques points enfoncés.

Les élytres sont ovalaires; l'angle huméral est bien marqué, aigu mais non épineux; la surface densément ponctuée devient granuleuse à la base et sur les côtés; elle est assez brillante sur la région voisine de la suture.

En dessous, la saillie du prosternum est en forme de pyramide quadrangulaire arrondie sur les arêtes et à la pointe; elle est dirigée en arrière et un peu vers le bas; le mésosternum est arrondi et faiblement canaliculé; le métasternum est légèrement déprimé et porte une grande fossette, faiblement marquée, assez bien délimitée en avant. Les pièces sternales et les segments abdominaux sont assez brillants.

Les pattes sont assez longues, plutôt grêles; les fémurs sont ponctués et dépolis; les tibias antérieurs ont une fourche terminale longuement saillante, à dents peu développées, mais aiguës; ils portent trois ou quatre petites dents en forme d'épines et de très petits denticules

intermédiaires. Les tibias médians portent une très faible épine; les tibias postérieurs une épine un peu plus forte, toutes deux placées au delà du milieu.

Les tarses sont, dans leur ensemble, très légèrement plus courts que les tibias; les quatre premiers articles sont régulièrement décroissants comme grosseur depuis le premier, et leurs soies inférieures occupent une surface de plus en plus réduite. Le cinquième article est un peu plus court que les trois qui le précèdent immédiatement, pris ensemble.

La couleur est un brun roux foncé, presque uniforme, nuancé de noir aux extrémités des fémurs et dans l'angle latéral du prothorax. La partie supérieure est un peu plus claire. Les tarses et les antennes sont noirs.

Les dimensions principales sont les suivantes :

Longueur totale, mandibules incluses : 23,5 à 29 mill. Longueur des mandibules 4 à 5,7 mill. Largeur de la tête : 6,9 à 10 mill. Largeur maxima, aux élytres : 8,1 à 10 mill.

Le plus grand spécimen vient de Penang; il a appartenu à la collection PASCOE et figure actuellement dans les collections de British Museum. Le deuxième exemplaire, qui m'a été gracieusement cédé par ce Musée, vient de Tenasserim.

**Description de Cétonides nouveaux de l'Afrique orientale
et de Madagascar [COL. SCARABAEIDAE]**

par A. BOURGOIN.

Pygora Donckieri, n. sp. — ♀. *P. Cowani Waterh. similis sed differt pygidio unituberculato, apice rotundato, nec sinuato.*

Forme, taille et coloration de *P. Cowani*. Dessus et dessous vert, bleuâtre sur le milieu du pronotum et sur les trois interstries internes de chaque élytre. Tête fortement ponctuée sur toute sa surface, à ponctuation confluyente dans les dépressions latérales du clypéus. Pronotum à ponctuation extrêmement fine, plus large que long, rétréci en ligne droite sur les deux cinquièmes antérieurs, à côtés parallèles sur les trois autres cinquièmes, à base très légèrement sinueuse. Scutellum très finement et éparsement ponctué. Élytres à quatre stries bien